



VRIJEME JE ZA DRUGO SUZBIJANJE AMERIČKOG CVRČKA

Posted on 11. srpnja 2019.



Categories: [Savjet](#), [Vinogradarstvo](#), [Zaštita bilja](#)

Obilaskom vinograda utvrđene su ličinke američkog cvrčka, a u narednom razdoblju očekuje se pojava odraslih oblika američkog cvrčka. Uočeni su i prvi simptomi zlatne žutice na bijelim sortama i crnim sortama u vidu uvijanja listova i promjene boje listova. Trenutno u vinogradima možete pronaći stadij ličinke: L3, L4 i L5 koje su prikazane na fotografijama.





Preporučamo svim vinogradarima da obave drugo tretiranje za američkog cvrčka. **Drugo tretiranje se vrši 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja.** Ukoliko je prošlo toliko od Vašeg prvog tretiranja u narednim danima obavite tretiranje. Insekticidi koji su registrirani za suzbijanje američkog cvrčka:

Kemijska skupina	Aktivna tvar	Pripravak	Primjena u vegetacijskoj sezoni	Karenca
Sintetski piretroidi	Deltametrin	Decis 2,5 EC	1	21 dan
	Esfenvalerat	Sumialfa SL	1	21 dan
	Cipermetrin	Cythrinx max	1	21 dan
Sintetski piretroidi i organo fosfati	Cipermetrin+	Nurelle D EC	1	21 dan
	klorpirifos etil	Chromorel-D	1	21 dan
Oksadiazini	Indoksakarb	Avaunt EC	3	10 dana
Organo-fosfati	Klorpirifos-metil	Reldan 22 EC	2	21 dan

Ekološki insekticidi registrirani za suzbijanje američkog cvrčka: **ABANTO, KRISANT EC i PIRETRO NATURA.**

Za praćenje odraslih oblika cvrčka preporučamo postaviti žute ljepljive ploče. Preporučuje se u vinograd veličine do 10 ha postaviti tri žute ljepljive ploče. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna do kraja rujna.

