

# OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA JABUKA

Posted on 31. srpnja 2019.



Categories: [Preporuka](#), [Voćarstvo i maslinarstvo](#)

Tag: [Varaždinska](#)

**Visoke dnevne temperature praćene oborinama pogoduju** razvoju sekundarne zaraze **krastavosti jabuke** (*Venturia inaequalis*), **gorka trulež plodova** (*Colletotrichum spp*), **smeđa trulež ploda** (*Stemphylium spp*), **trulež plodova** (*Neofabraea spp*). **Kod zaštite posebnu pozornost treba dati zaštiti ploda te kod izbora fungicida vodite računa da oni djeluju na suzbijane gore navedenih bolesti te da se poštuje karenca.**

PRIPRAVAK	BOLEST	KARENCA
SCRAB 80 WG KAPETAN 80 WG CAPTION80 WG	krastavost, trulež ploda, gorka trulež ploda	21 dan
TOPSIN M 500	trulež ploda	14 dana
GEOXE	Siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež	3 dana

**Za suzbijanje pepelnice mogu se primijeniti pripravci: Stroby (karenca 35 dana), Zato 50 WG (karenca 14 dana), Narivo 75 WG (karenca 35 dana) ili Luna Experience (karenca 14 dana) .**

Također je potrebno i redovito suzbijanje **jabučnog savijača** (*Cydia pomonella*), a za zaštitu može se primijeniti jedan od insekticida: **Mospilan 20 SP (karenca 14 dana)**, **Reldan 22 EC (karenca 21 dana)**, **Calypso SC 480 (karenca 14 dana)**, **Coragen 20 SC (karenca 14 dana)** ili **Affirm (karenca 7 dana)** .

**Preporučamo da obratite pozornost na broj dozvoljenih primjena fungicida tijekom jedne vegetacijske godine te da vodite računa o karenci.**

**Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu <http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.**

**Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr**

**Andreja.v-pofuk@mps.hr**